



TITLE:

28. 場の量子論におけるeffective potentialについて(大阪大学大学院理学研究科物理学専攻,修士論文題目・アブストラクト(1986年度),その2)

AUTHOR(S):

乗松, 誠司

CITATION:

乗松, 誠司. 28. 場の量子論におけるeffective potentialについて(大阪大学大学院理学研究科物理学専攻,修士論文題目・アブストラクト(1986年度),その2). 物性研究 1987, 48(5): 660-660

ISSUE DATE:

1987-08-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/92666>

RIGHT:

27. (π^+, K^+) 反応を用いたハイパー核実験 におけるデータ収集システムの開発

野 海 博 之

(π^+, K^+) 反応を用いたハイパー核実験を行うためのスペクトロメータが, KEK・PSK2 ビームラインに新しく建設された。この実験は約 $1.05 \text{ GeV}/c$ の π^+ を入射ビームとして, ターゲット核にあてて, 反応後に出てくる約 $0.72 \text{ GeV}/c$ の K^+ を検出し, 生成されたハイパー核を観測しようとするものである。この種の実験を行うとき, 主に次の二点が要求される。

1. 反応前後の粒子の運動量ベクトルを精度よく決定すること。
2. 多大なバックグラウンドの中から (π^+, K^+) 反応だけを選ぶこと。

1 は, 生成された A 粒子の核内での状態を観測するのに必要で, 特に重いハイパー核での実験で厳しく要求される。2 は, 1 の要求を満たす上でも S/N 比を良くし, 望むイベントの統計をかせぐために大変重要である。この実験のために開発されたスペクトロメータ及びハードウェアからソフトウェアまで含めたデータ収集システムについて報告する。

28. 場の量子論における effective potential について

乗 松 誠 司

場の量子論における自発的対称性の破れについて論ずるのに effective potential が重要な役割を果たすが, この effective potential の解釈には, 互いに inconsistent な解釈が存在する。この混乱を取り除くために path-integral formulation における boundary condition を議論する。その結果, effective potential に対する consistent な解釈を得た。